

Nøgle til subsektion Laponica

Allerede i 1916 brugte Sir Bayley Balfour skjoldhårene på bladundersiderne til at opdele subsektion Laponica i seks undergrupper. Desværre viste det sig at skjoldhårene kan være for variable indenfor specielle arter, til at man med sikkerhed kan bruge dem alene, men må bruge andre karestiristika. Phillipson og Phillipson gjorde et forsøg på at anvende nogle af de lettest bestemte karakteristika, men også han fandt at der var mange undtagelser. Af de vigtigste karaktertræk ved skjoldhårene skal nævnes:

- a. Farven af skjoldhår, fra gennemsigtig-farveløs til næsten sorte.
- b. Om alle skjoldhår på samme blad er ensfarvede eller tofarvede.
- c. Om de mørke skjoldhår (hvis de findes) er få og uregelmæssige placeret eller talrige og jævnt fordelt.
- d. Tæthedens af skjoldhår (overlappende eller andre afstande). Der kan være store forskelle på skælefstanden i 1 årige og i nye blade og indbyrdes mellem kloner.

Af andre karakterer syntes jeg at der bør nævnes:

- f. Varierende størrelse af skjoldhårene.
- g. Centrale farvepletter i skjoldhårene.
- h. Forskel i farven, f.eks. aftagende udad fra bladmidte.

Desuden er bægerbladenes (calyx) størrelse vægtet som 2. prioritet, medens antal støvdragere og især skæl på bærerfligene er prioriteret lavt.

Det er ønsketænkning, hvis denne gruppering, samt nedenfor beskrevne nøgle, kan anvendes til at bestemme Laponica planter generelt, men det har vist sig i praksis at der skal flere træk til for at artsbestemme en plante indenfor denne sektion, idet den individuelle variation er for stor. Desuden vokser der hybrider mellem arterne, som ikke umiddelbart kan identificeres som en hybrid og derfor ikke kan bestemmes efter nøglen. Det er dog forkert at opfatte planter, som er ubestemmelige ved hjælp af en nøgle, som værende hybrider.

For at identificerer hybrider må man kende forældrene grundigt. Dette kan gøres ved at finde steder, hvor der er en population af ensartede planter fra hver af forældrene og lære disse at kende. Når dette er gjort kan man se om hybriderne så er en mellemting.

Nøgle Laponica har et stort udbredelsesområde og findes måske på 1000 lokaliteter. På hver lokalitet ser de enkelte planter næsten ens ud og der er kun mindre forskelle mellem nabo-populationen, men stor forskel mellem populationerne i modsatte ender af udbredelsesområdet.

Og hvad gør man så? Skal man lave en gruppe uden at der er et fælles træk for gruppen eller skal man opdele populationen i flere arter i flere arter således at man kan bestemme dem efter en nøgle?

Den skal bemærkes at grupperingen gælder for modne blade, hvis intet andet er beskrevet.

Arterne beskrevet i parentes gælder at der er beskrevet varianter, der ikke hører til gruppen)

Opdelingen er efter Phillipson & Phillipson--parenteserne er efter Hans Eiberg.


Da systematikken ændres frem og tilbage er mange af de gamle arter inkluderet som forma =f eller varianter af de nuværende accepterede arter. K. Cox har selv opgivet Laponica subsektionen, idet han syntes at den er for kompliceret pga. hybridisering mellem arterne.


Skjoldhår = skæl. Brug en lup med mindst 10x forstørrelse

1. Ensfarvede, blege og tætsiddende (overlappende eller berørende).
(cuneatum)
hippophaeoides
- (thymifolium)
tsaii

	intricatum (nitidulum) yushuense	websterianum dawuense Danba type
2.	Ensfarvede, mørke og tætsiddene: amundsenianum complexum dasypetalum (rupicola var rupicola og f. achroanthum)	tapetiforme (yungningense) qinghaiense
3.	Ensfarvede og spredte: fastigiatum flavidum var flavidum lungchiense	(impeditum = tofarvede syntes jeg; HE) polycladum
4.	De mørke skjoldhår få og uregelmæssigt placeret. (dvs. også lysere skjoldhår) bulu minyaense thymifolium	orthocladum telmateium
5.	De mørke skjoldhår talrige og jævnt fordelt. (dvs. også lysere skjoldhår) burjaticum capitatum lapponicum labolengense joniense zheguense taibaiense gologense	(nivale) "svagere kontrast mellem de to farver" rupicola (russatum) declivatum maowenense bamaense xiguense zekoense

Skæltyper og fordelinger på undersiden af bladene. De fleste mørkere i centrum (Hans Eiberg)





Brodspids: **telmateium**, **russatum**, **rupicola var rupicola**, men også mere eller mindre hos: *thymifolium*, *nitidulum* var *omeiense*, *fastigiatum*, *flavidum*, *impeditum*.

Uden brodspids: **nivale**, **capitatum**. Samt mere eller mindre for mange andre arter.

Senest har Yang Hanbi og D. Chamberlain lavet en nyere beskrivelse af subsektionen i Flora of China med tilhørende nøgle samt nye arter inkorporeret. Da jeg opdagede at bestemmelsen *R. flavidum* var. *psilotylum* ikke var inkorporeret i nøglen besluttede jeg at videreføre og opdatere min egen nøgle som et konglomerat af alle andre nøgler. *Man må dog regne med at nøglen kun er vejledende og ikke alle planter kan bestemmes efter denne - kun de mest typiske for arten, varianten eller formen.*

Nøgle til arterne.

Cullens nøgle 1980, som oprindeligt er oversat fra engelsk af Poul Hjort 1980. Nu ændret, justeret, præciseret og opgraderet med gamle former/var. af Hans Eiberg 2005.
En svaghed ved Cullens-Phillipsons system er at de lægger primært vægt på trækket: ensfarvede skæl kontra skæl af to farver. Her er et problem at nogle arter har begge former: *orthocladum*, *nivale*, *tapetiforme*, *telmateium*, *thymifolium* mm. Desuden lægger de mindre vægt på griffellængden for de arter der har 2-farvede skæl, men stor vægt på de arter der har ensfarvede skæl (punkt 14) her er der problemer med yngningense som kan have forskellig griffellængde. Jeg anbefaler at man kontrollere bestemmelsen ved at sammenligne med Davidians nøgle, hvor der også lægges vægt på om kronen har skæl på ydersiden, men ikke på brodspidser.
R. fragariflorum er ikke i denne nøgle, selvom den burde være her efter Davidian og Chamberlain.
Nøglen bliver lagt på nettet www.rhododendron.dk/lap-nogle.html og opdateres ved lejlighed.

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Nyskudene med fastsiddende børsthår | setosum |
| - | Nyskuddene med bløde hår (efter Davidian, men ingen kloner kendes i kultur med hår) | verruculosum |
| - | Skudene kun beklædt med skæl | 2 |
| 2. | Skæl på undersiden af bladet er matte, hvide eller lyserøde (spredte) blade blågrønne | fastigiatum |
| - | Skæl og bladfarve ikke som ovenfor | 3 |
| 3. | Krone 20 mm eller længere, calyx ofte >4 mm dybt fliget, rødlig), blad med brod | cuneatum |
| - | Kronen ca 14-18mm, calyx 4-5mm dybt fliget | cuneatum f. <i>scleroecladum</i> |
| - | Kronen ca 14-18mm, calyx grøn >4mm, planten op til 60cm, blad uden brod | dawuense |
| - | Bægerflige (calyx) mindre end 4mm. Krone mindre end 20 mm lang (ikke bred) | 4 |
| 4. | Skæl på undersiden af de gamle blade ensartet farvede [fig. 1,2,3,7,8] | 5 |
| - | Skæl på undersiden af de gamle blade af to farver (eller nuance) [fig. 4,5,6,9] Ses uden lup | 23 |
| 5. | Blomster gule eller hvide (var. album former går til 8) | 6 |
| - | Blomster ikke gule eller hvide | 8 |
| 6. | Skæl på undersiden af bladet med stor indbyrdes afstand [fig. 3], frugtknude glat..... | flavidum var.flavidum |
| - | Skæl på undersiden af bladet siddende tættere [fig. 1,2,5a,7] | 7 |
| 7. | Bæger 1,5 mm langt eller kortere | orthocladum var. microleucum |
| - | Bæger 2,8 mm eller længere | websterianum var. <i>yulongense</i> |
| 8. | Skæl på undersiden af bladet ens blege (halmfarvede til lysebrune) [fig. 1] | 9 |
| - | Skæl gulligrøde, calyx 2mm, griflen kortere end støvtrådene | nivale var boreale f. alpicola |
| - | Skæl på undersiden af bladet ens rødbrune, gulbrune, brune [fig. 2] | 14 |
| 9. | Støvdragere 4 - 7, støvtråde oftest glatte, kronen 5-7mm, blade kortere end 15mm | tsaii |
| - | Støvdragere flere end 7, støvtråde hårede ved grunden | 10 |
| 10. | Støvdragere og griffel ikke uddragende af kronrøret 10 støvdragerer..... | intricatum |
| - | Støvdragere og griffel ikke uddragende af kronrøret 5 støvdragerer..... | intricatum f. <i>blepharocalyx</i> |

- Støvdragere og griffel længere end kronrøret	11
11. Blomsterstand med mere end 2 blomster	<i>hippophaeoides</i>11A
- Blomsterstand med 1 eller 2 blomster bæger kortere end 1,5mm	12
- Blomsterbæger 2mm eller længere.....	13
11A Støvdragere samt griflen kortere end kronen, calyx ca 2mm	<i>hippophaeoides var hippophaeoides</i>
- Støvdragere lidt længere/lig kronen, skæl lysebrune.....	<i>hippophaeoides var occidentale</i>
- Griflen dobbelt så lang som kronen, calyx 1mm.....	<i>fimbriatum</i>
12. Griffel ca 1-2mm, blomst ca 4-6mm blad uden brod (før thymifolium)	<i>yushuense</i>
- Griffel ca 2-4mm, blomst ca 5-9mm	<i>thymifolium f. polifolium</i>
- Griffel ca 1-2mm, blomst ca 8-10mm	<i>thymifolium f. spilanthum</i>
- Griflen længere end kronen, blomst 7-11mm, blad ofte med brod.....	<i>thymifolium</i>
Men blomst >11mm; skæl store lyse, overlappende , blad ofte uden brod.....	<i>Danba typen</i>
13. Undersidens skæl-midte ikke mørkere, blade i reglen smalt elliptiske, blomst ofte stor 15-19mm Bladgrunden udvider sig ofte jævnt fra stilken ..	<i>websteranum var. websteranum</i>
- Midterområde af skæl på undersiden gyldent [fig 8], blade i reglen elliptiske, Bladgrunden udvider sig brat fra stilken, blomst ofte 12-13mm	<i>nitidulum var. nitidulum</i>
- Skæl ensfarvede (ellers 13b) og afstanden indbyrdes er ca. 1diameter	<i>telmateium f. verruculosum</i> Cox
14. Griffel kortere end eller af samme længde som støvdragene	15
- Griffel tydeligt længere end støvdragene	17
15. Støvdragere 5 — 6, skæl tæt arangerede, rørformede kronrør, støvknapper netop udragende.....	<i>complexum</i>
- Støvdragere ca 10, ej rørformet blomst	16A
16A Skæl tæt arangeret (afstand 0-1d) [fig 2].....	16
- Skæl med afstanden 1,5-2d [fig 3], kort griffel, hver anden støvdragere lidt kortere, blanke blade....	<i>lysolepis</i>
16. Blade lancetformede eller smalt elliptiske(L:B >3 : 1) kron. y. elepidot	<i>orthocladum var. orthocladum</i>
- Blade elliptiske til bredt elliptiske (L:B ca 2-3 : 1) kronens y. elepidot.....	<i>yungningense</i>
- Lav tæt plante, blad med brodspids (L:B=2:1) kronens yderside lepidot.....	<i>telmateium f. drumonium</i>
17. Fuldt udviklet blad med brune skæl spredt (afstand >skælradius=r)over den bleg/grønne underside	18
- Fuldt udviklet blad med tættere siddende skæl (afstand <r) over den mere brune underside	19
18 Blade aflange (L:B >2) Skæl jævnt fordelt [fig 2] Bægerflige længere end 2,5mm	18A
- Blade aflange (L:B >2) og længere end 10mm. Bægerflige kortere end 2,5mm.....	18B
- Blade L:B=2 mørkegrønne blanke (L:B=2:1) op til 10mm lange. Skæl lidt ujævnt fordelt, bægerflige 0.5-1mm (skæl burde være tæt på hinanden)	<i>nivale ssp boreale</i> aff
- Blade L:B= 1.5 blade matgrønne 10-15mm lange.	<i>tapetiforme</i>
18A 2-3 blomster i klasen, 8-15mm blå blomster	<i>impeditum</i>
- 2-3 blomster i klasen , rosa blomster.....	<i>impeditum f. litangense</i>
- 1-2 blomster i klasen, 15-16mm. Blomsterstilke 3-5mm	<i>lungchiense</i>
18B 3-4 blomster i klasen,	<i>polycladum</i>
- 4-6 blomster i klasen	<i>polycladum f. compactum</i>
19. Bægerflige kortere end 2,0 mm	20
- Bægerflige længere end 2,0 mm.....	21
- (hvis der er tydelig brodspids og L:B = 2:1 kan det være <i>telmateium f. diacritum</i>)	
20. Blade bredt elliptiske eller runde, underside af blad rødblun (L:B=1-1.5 : 1)	<i>tapetiforme</i>
- Blade lancetformede eller smalt elliptiske, underside af blad brunt (L:B=3-5:1) <i>orthocladum var. longistylum</i>	
- Blade overside og underside gulgrøn (L:B=3:1)	<i>x edgarianum</i>
- Blade L:B=2 mørkegrønne blanke (L:B=2:1) griflen>>støvdragere	<i>nivale ssp boreale f. nigropunctatum</i>
- Som 3+, men griflen kortere eller lig støvdragere	<i>nivale ssp boreale f. strictophyllum</i>
21. Yderside af kronen håret (skæl gulbrune) blomst 12-15mm, 10 støvdragere, blade v-formet	<i>dasyptetalum</i>
- Yderside af kronen uden hår. (undertiden meget svagt dunhåret) calyx-rand ikke med lange hår.....	22
22. Underside af blad ravfarvet (calyx 4-5mm)	<i>amundsenianum</i>
- Underside af blad blegere (rustfarvet eller gyldenbrun) (calyx < 4mm)	<i>hippophaeoides f. glomerulatum</i>
- Tæt lav vækst, blade <10mm (Sikkim, Tibet)	<i>nivale ssp nivale</i>
- 8 støvdragere, blomst 10mm	qinghaiense
- Undersiden og oversiden med mbrune skæl, 5 støvdragere, calyx ca. 2mm, Skæl på ydersiden af kronen	<i>ruplicola var ruplicola f. achroanthum</i>
- Ingen af disse (variant/aff – arten bør have 2 forskellige skælfarver)	23
23. Ej gul krone, de mørkere skæl få (1: 7-20) og spredte [fig. 4,6]	24
- Ej gul krone, de mørkere skæl mere jævnt fordelt (1:1-5) [fig. 5,9].....	29
- Kronen gul, skæl spredte	<i>flavidum var. psilotylum</i>
- Kronen gul. 1blomst i klasen, skæl tætsiddende. 2-4m høj	maowenense

- Kronen gul, de mørkere skæl jævnt fordelt, flere blomster pr klase, ofte 1/2m	34e-f
24. Bægerflige længere end 4,0 mm, farvet. Kronen skællet på ydersiden	minyaense
- Bægerflige kortere end 4,0 mm oftest grønne	25
25. Baggrundsskællene (=de fleste) på bladets underside brungule. Blade L:B = 1-3:1	26
- Baggrundsskællene på bladets underside lysebrune (blade L:B=4-5:1) griffel kort	orthocladum
- Som orthocladum men skæl er brune og griffel > støvdragere	orthocladum var longistylum
- Skæl lyse evt få/ingen mørkere på de gamle blade, grenet med blade < 1cm	
- Bladene på nyskuddene randhårede, skæl store, Sichuan edgarianum, polyfolium	Danba typen
- Blade (L:B=2:1) støvdragere = griflen, kronen yderside uskællet, ingen blad mucro. Big Snow Mountain	32
26. Krone skællet på ydersiden	27
- Krone uden skæl på ydersiden	28
27. Blad ikke brodspidset 12-21 mm L:B=3-4:1 (Tsangpodalen, Tibet).	bulu
- Blad stærkt brodspidset 3-12 mm (Yunnan, Sichuan).....	telmateium (incl f. idoneum)
- 7-8 støvdragere, blade brodspidse, skæl creme + lysebrune	telmateium f. verruculosum Cox
- Grønlige skæl ikke tætsiddende, men afstand ca. skældiameteren L:B=2-2.5:1	lungchiense
28. Blomst rosenrød eller purpur, blade L:B=3:2 og spidse	titidulum var. omejense
- Kompakt dværgplante, griffel < støvtråde.....	nivale ssp boreale f. ramosissimum
- Blomst gul, blade L:B= 2-3:1	flavidum var. psilotylum
29. Blade ikke små, men længere end 10-11mm.....	30
- Blade uden brodspids, gamle skæl sorte. Bladspris rundet. Kronen 4-5mm, en blomst	bamaense
- Blad uden brodspids, med stærk kontrast mellem mørke og blege skæl [fig. 5], blomst	
- Lille (i reglen mindre end 9,0 mm langt) 2 blomster i klasen. Calyx randhåret	nivale ssp australe
- Blad uden brodspids, med svag kontrast mellem mørke og blege skæl [fig.9] griflen > støvtråde. Calyx 0-1mm	nivale ssp boreale f. paludosum
- Blad uden brodspids, med svag kontrast mellem mørke og blege skæl [fig.9] griflen < støvtråde. Calyx 0-1mm, opret vækst, småabl. til 12mm	nivale ssp boreale f. strictophyllum
- Blomst mørkeblå-violet. Skæl [fig 9]. Calyx 0-3mm. Grifl>støvdr	nivale ssp boreale f. violaceum
- Blad med brodspids, eller ikke som ovenstående	30
30. Bæger 2,5 mm langt eller kortere	31
- Bæger længere end 2,5 mm (3-6mm).....	33
31. Blad lancetformet eller smalt elliptisk (L:B ca 4 : 1)	orthocladum
- Blad elliptisk (L:B=ca.2-3 : 1) Griflen lidt kortere end støvdragere	321
- Blad elliptisk (L:B=ca.2-3 : 1) Griflen lidt længere end støvdragere	322
321 Bægerblade ca. 0.5mm, lille busk op til 15cm, Sibirien	burjaticum
- Bægerblade ca. 1mm, kronen over 13-17mm bred	nivale ssp boreale
- Kronen 16mm. Blad uden mucro. Bægeret skællet, skæl rust-sortbrune	joniense
322 Bægerblade ca. 0-1mm, kraftigvoksende, kronen op til 25mm bred .Danba*	
- Bægerblade ca. 1-1.5mm, glat. Svaghvoksende. Krone>støvdr	declivatum
- Griflen lidt længere end støvdr. Bægerbladene ca 2(-4)mm. Opret vækst 1m	nivale f. paludosum
Men bægeret randhåret. Kronrøret 4-6mm. Opret vækst 1m	zekongense
- Bægerblade ca. 1-2mm.....	35
33 Blad uden brodspids, længde:bredde ca 2:1. Kronen glat på ydersiden [fig 7] 3-7 blomster	capitatum
- Kronen 15mm, 2 blomster/klase. Bladet med blege skæl på oversiden. Opret vækst	xiguense
- Kronen 10-13mm, calyx 3mm, glat. Opret vækst	golongense
- Som capitatum, men støvdr. kortere end kronen. Blade L:B= 3:1	zheguense
- Griflen ca. 1cm længere end støvdragere, L:B=2.5:1	labolengense
- Blade med svag brodspids, længde:bredde ca 3:1, bleg underside, skæl spredte d>1	impeditum
- Blad med brodspids. Skæl tætsiddende	34
34. Bægerflige uden et midterbånd af skæl. Krone glat på ydersiden, 8-10støvdr	russatum
- Som overstående, skæl rubinrøde på oversiden. Busk op til 30cm	taibaiense
- Bægerflige med et midterbånd af skæl. Krone skællet på ydersiden, 8-10støvdr.	rupicola var rupicula
- Som +, men med 5-6 støvdragere, blå-purpursort	rupicula f. achroanthum
- Som +, men med 6-8 støvdragere, gul og blad (L:B= 2:1) uden skæl på calyx	rupicola var chryseum
- Som +, men med 8-10 støvdragere, gul og blad (L:B=3:1) med skæl på calyx og frugtknuden håret.....	rupicola f. muliense
35. 5 (10) støvdragere. Blade 5-15mm. Kronen 7-10mm (Grønland, Norge, Canada)	lapponicum
- 10 støvdragere. Blade 6-20mm (Sibirien). Kronen 10-13mm	lapponicum f. parviflorum
- 10 støvdragere. Blade 10-25 mm, brunskællet. Kronen 13-15mm (Japan)	parviflorum (Japan)
- Krybende former kaldes	lapponicum f. confertissimum

Danba* Lapponicum fundet af Hans Eiberg i Danba Gorge og Gonga Shan 2004
og er sikkert en form af **R. thymifolium**

Blomster ca. 13-(26)mm bred, rosa - lyseblå uskællet på ydersiden.. Flad, rør=2mm.
1-2 blomster på skuddet. Blomsterstilk meget kort.

Nye skud uden brune skæl-gamle med brune store skæl blandt de grønne (ca. 1:5). Afstand mellem
skæl ca. 0- ½ diameter. L:B=2.5-3 : 1 og ca. 6-9mm lange. Nye blade (lysegrønne) kan være hårede
på randen. Ingen mucro.

Calyx lille (.0-2mm) tæt skællet, er svagt opdelt i lober.

Griflen >> støvdragerne. Griflen glat. Støvdragerne (10) kraftigt håret ved basis og på længde som
kronbladene. Ovarie tæt skællet.